

Link do produktu: <https://animall.pl/clearonil-krople-pchly-kleszcze-dla-psa-10-20kg-p-7343.html>



CLEARONIL krople PCHŁY KLESZCZE dla psa 10-20kg.

Cena	26,87 zł
Numer katalogowy	179402
Producent	FRANCODEX

Opis produktu

CLEARONIL dla małych psów o wadze od 10 do 20 kg.

Data ważności: 11/2024

CLEARONIL Roztwory do nakrapiania produkty OTC (wydawane bez przepisu lekarza).

Mogą być wprowadzane do obrotu wyłącznie przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenie.

CLEARONIL Laboratoire Francodex to krople przeciwko pchłom i kleszczom, które zapewnią psu skuteczną ochronę przed inwazją tych pasożytów niezależnie od ich stadium rozwoju.

Produkt w formie kropli spot-on w jednodawkowych pipetach znacznie ogranicza ryzyko przedawkowania.

Zawiera fipronil, związek chemiczny, który skutecznie eliminuje pchły i kleszcze.

Substancja czynna:

fipronil 134 mg,

Substancje pomocnicze:

butylohydroksyanizol (E320) 0,268 mg, butylohydroksytoluen 0,134 mg.

Opakowanie 3 pipety po 134 mg.

Ochrona przeciw pchłom do 8 tygodni.

Ochrona przeciw kleszczom do 4 tygodni.

EAN: 3283021794029

Sposób podawania:

Podawać przez nakrapianie.

Wyjąć pipetkę z blistra. Pipetkę trzymać w pozycji pionowej i odłamać górną część zatyczki, tym samym otwierając pipetkę.
Rozdzielić palcami sierść, aby odsłonić skórę zwierzęcia. Przyłożyć końcówkę pipetki bezpośrednio do odsłoniętej skóry i delikatnie ścisnąć.
Wycisnąć mniej więcej po połowie zawartości w dwóch miejscach wzdłuż grzbietu kota, najlepiej u podstawy głowy i pomiędzy łopatkami.
Ścisnąć pipetkę kilka razy, aby upewnić się, że całość przewidzianej dawki została podana.
Unikać nakładania roztworu na sierść oraz nie wcierać roztworu w skórę.
Podanie produktu we wskazany sposób minimalizuje prawdopodobieństwo, że zwierzę zliże roztwór po podaniu.
Należy zadbać o to, by sierść nie została nadmiernie zwilżona produktem, ponieważ w miejscu podania wyglądać będzie na posklejaną.
Jeśli jednak do tego dojdzie, wygląd sierści wróci do normy w ciągu 24-48 godzin po zastosowaniu.
Badania produktu z udziałem kotów dostarczyły względnie mało danych w tym zakresie, natomiast z badań na psach wynika, że w przeciągu 24-48 godzin po podaniu na sierści mogą pojawić się kryształki i może dojść do nieznacznego łuszczenia.

Środki ostrożności:

Do stosowania zewnętrznego. Nie połykać.

Nie dopuścić do połykania przez zwierzę. Unikać kontaktu z oczami zwierzęcia.

W razie przypadkowego dostania się produktu do oka, należy niezwłocznie i dokładnie przemyć je wodą.

Nie stosować produktu na rany lub uszkodzoną skórę.

Może drażnić oczy i błony śluzowe ludzi. Unikać kontaktu z ustami i oczami.

W razie przypadkowego kontaktu z oczami należy niezwłocznie i dokładnie

przemyć je wodą.

Unikać kontaktu zawartości ze skórą. Jeśli dojdzie do kontaktu należy umyć ręce wodą z mydłem.

Umyć ręce po podaniu produktu. W trakcie podawania produktu nie palić, nie pić i przyjmować pokarmów.

Osoby o znanej nadwrażliwości na fipronil lub jakiekolwiek składniki produktu powinny unikać kontaktu z lekiem.

Bezpośredni kontakt ze zwierzętami nie jest wskazany zanim miejsce podania produktu nie wyschnie.

Nie należy zezwalać dzieciom na zabawę z leczonymi zwierzętami do momentu wyschnięcia miejsca podania.

Zaleca się zatem, aby nie stosować produktu w ciągu dnia, ale dokonać podania wieczorem.

Wkrótce po zabiegu zwierzęta nie powinny spać z właścicielami, zwłaszcza z dziećmi. Produkt może uszkadzać malowane,

lakierowane lub innego rodzaju powierzchnie lub wyposażenie gospodarstwa domowego.

Wskazania lecznicze:

U PSÓW: Leczenie inwazji pcheł (*Ctenocephalides felis*).

Skuteczność owadobójcza w przypadku nowych inwazji pcheł dorosłych utrzymuje się przez 8 tygodni.

Leczenie inwazji kleszczy (*Rhipicephalus sanguineus* oraz *Ixodes ricinus*).

Produkt zachowuje skuteczność roztoczbójczą przez okres do 4 tygodni w przypadku kleszczy

(z gatunków *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus*).

Jeśli w momencie zastosowania produktu na ciele zwierzęcia obecne są kleszcze z gatunku *Dermacentor reticulatus*, jest możliwe,

że nie wszystkie zginą w przeciągu 48 godzin, niemniej wszystkie osobniki zostaną wyeliminowane w ciągu

Harmonogram leczenia:

Minimalny odstęp między kolejnymi podaniami wynosi 4 tygodnie.

W niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność wydłużenia tego okresu.

Stosowne porady należy zasięgnąć u lekarza weterynarii.

Przeciwwskazania:

Nie stosować u szczeniąt w wieku poniżej 2. miesiąca życia i (lub) psów o masie ciała poniżej 10 kg.

Nie stosować u królików! Stosowanie produktu może spowodować działania niepożądane, a nawet śmierć.

Produkt ten został opracowany specjalnie dla psów.

Nie stosować u kotów, ponieważ wiąże się to z ryzykiem przedawkowania.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Nie stosować u zwierząt w złym stanie zdrowia, zwierząt leczonych lub wracających do zdrowia po okresie choroby.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:

W okresie spodziewanego skutecznego działania produktu (tj. po upływie jednego tygodnia)

kleszcze są eliminowane i odpadają od żywiciela w ciągu 48 godzin od inwazji,

przy czym zazwyczaj nie dochodzi do odżywiania się kwią żywiciela.

Ponieważ po zastosowaniu leczenia może dojść do przyczepiania się pojedynczych osobników, nie można wykluczyć transmisji chorób zakaźnych przenoszonych przez kleszcze.

W większości przypadków martwy kleszcz samodziennie odpadnie od skóry żywiciela, niemniej pozostałe kleszcze można łatwo usunąć za pomocą delikatnego pociągnięcia.

Pchły często przedostają się ze zwierzęcia do jego koszyka, na wyściółkę legowiska lub stałe miejsca odpoczynku na dywanach lub tapicerowanych meblach,

stad w przypadku znacznej inwazji pcheł miejsca te powinny zostać poddane działaniu odpowiedniego

środka owadobójczego w momencie rozpoczęcia leczenia, a następnie być regularnie odkurzane.

Nie dopuszczać, by zwierzę często pływało i unikać częstego kąpienia zwierzęcia z użyciem szamponu, ponieważ zachowanie skuteczności produktu w takich przypadkach nie było badane.

Optymalne przeciwdziałanie w przypadku obecności pcheł

w gospodarstwie domowym z większą liczbą zwierząt domowych powinno polegać na zastosowaniu odpowiedniego środka owadobójczego wobec wszystkich psów i kotów w gospodarstwie domowym.

Działania niepożądane (częstość i stopień nasilenia)

Jeżeli dojdzie do wyizywywania miejsca podania, może pojawić się krótkotrwałe, intensywne ślinienie, które spowodowane będzie głównie rozpuszczalnikami zawartymi

w produkcie. Wśród bardzo rzadkich, spodziewanych działań niepożądanych

zgłaszano przejściowe odczyny skórne w miejscu zastosowania (luszczenie się skóry, miejscowa utrata sierści, podrażnienie skóry, swędzenie i zaczerwienienie)

oraz uogólnione podrażnienie skóry lub utratę sierści. W rzadkich przypadkach, po zastosowaniu obserwowano

nadmierne ślinienie się oraz odwracalne objawy z układu nerwowego (np. pobudliwość, przynębienie) lub wymioty.

Jest to produkt leczniczy weterynaryjny. Przeczytaj uważnie instrukcje umieszczone na ulotce.