

Link do produktu: <https://animall.pl/prevendog-6-m-cy-obroza-biobojcza-75cm-25kg-1szt-p-7496.html>



PREVENDOG 6 m-cy Obroza biobójcza 75cm >25kg 1szt

Cena	40,99 zł
Numer katalogowy	FR179192
Kod EAN	3283021791929
Producent	FRANCODEX

Opis produktu

OBROŻA BIOBÓJCZA PREVENDOG Laboratoire Francodex 75 cm
dla dużych psów o wadze powyżej 25 kg - 1 szt.

Działa 6 miesięcy.

DATA WAŻNOŚCI: 10.2024.

Opakowanie zawiera 1 sztukę obroży.

OBROŻA BIOBÓJCZA PREVENDOG Laboratoire Francodex chroni przed pasożytami wrażliwymi na deltametrynę.

Może być stosowana u psów od 7 tygodnia życia.

Zapobiega inwazji kleszczy (Ixodes ricinus i Rhipicephalus sanguineus),

dzięki działaniu roztoczebójczemu przez okres 6 miesięcy.

Zapobiega ukąszeniom moskitów (Phlebotomus perniciosus) dzięki działaniu odstraszającemu (przeciwdziała żerowaniu) przez okres 5 miesięcy.

Zapobiega ukąszeniom komarów (Culex pipiens) dzięki działaniu odstraszającemu (przeciwdziała żerowaniu) przez okres 6 miesięcy.

Nie stosować u kotów.

Sposób użycia:

Wyjąć obrożę z opakowania i oderwać pasek umożliwiający wygodne otwarcie.

Założyć obrożę w taki sposób, aby nie przylegała zbyt ściśle do szyi zwierzęcia.

Miedzy szyją psa, a obrożą powinny mieścić się obok siebie dwa palce.

Wsunąć końcówkę obroży w zapięcie i jeżeli wychodząca z zapięcia końcówka obroży jest dłuższa niż 5 cm,

nałożyć odciąć kawałek obroży powyżej tych 5 cm.

Obroża jest zaprojektowana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zwierzęcia po jej założeniu (ochrona przed uduszeniem).

W przypadku bardzo mało prawdopodobnej sytuacji zahaczenia się psa o przeszkodę,

zwierzę własnymi siłami jest w stanie rozciągnąć obrożę w takim stopniu, aby szybko się z niej uwolnić.

SKŁAD: 1 obroża 75 cm zawiera:

substancja aktywna: deltametryna – 1,304 g, substancja pomocnicza: dwutlenek tytanu (E171) – 0,465 g, węgiel aktywny – 0,024 g

Waga: 32,6 g.

-ochrona przed kleszczami, komarami i moskitami od 5 do 6 miesięcy

-zabezpieczenie przed uduszeniem

-dla psów od 7 tygodnia życia

Przeciwwskazania:

Ze względu na brak odpowiednich badań nie stosować u szczeniąt poniżej 7 tygodnia życia.

Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Nie stosować u kotów.

Nie stosować u psów ze zmianami skórnymi.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:

W związku z tym, że działanie obroży staje się w pełni skuteczne po upływie jednego tygodnia,

najlepiej jest ją założyć tydzień przed prawdopodobnym narażeniem zwierząt na inwazję.

Kleszcze takie zostaną zabite i same odpadną od żywiciela w ciągu 24-48 godzin od momentu inwazji.

bez pobrania od niego krwi, przy czym nie można wykluczyć dalszej obecności pojedynczych kleszczy w czasie noszenia obroży.

W związku z powyższym nie można wykluczyć przeniesienia chorób zakaźnych przez kleszcze.

W niekorzystnych warunkach przeniesienie chorób zakaźnych przez moskity nie może zatem zostać całkowicie wykluczone.